

1. *R. Canina rubra* Desv. l. c. p. 114 p. — *R. Donata* ECHTYS.
 2. *R. Canina umbellata*, *petioli glandulosi-hispidi aculeatis; floribus pallide rubris; subumbellatis; pedunculis glabris* (N.) Ressemble, par le port, au *Collina* (N.)
 3. *R. Canina aculeata*, *petioli angulatis aculeatis; floribus 3-5, subsessilibus, corymbis; ex albo roseis* (N.)
 4. *R. Canina subumbellata*, *foliis elliptico-ovatis; pedunculis hispids, aut glabris* (N.)
 5. *R. Canina ovata* (*pedunculis hispids*) Desv. l. c. var. 2.
 6. *R. Canina glandulosa* Rat. l. c. p. 75, var. 1. — *R. stipularis* MÉRAT 192. — *R. Canina stipularis* Nouv. DUCHAU. — *R. Sepium stipularis* Desv. l. c. var. 1.
 7. *R. Canina lanuginea* Desv. l. c. p. 114, var. 2.

S. R.

Tubes des calices hispides, ainsi que les péduncules.

* Tubes globuleux.

III. *R. VERTICILLACANTHA* MÉRAT.

Voir MÉRAT, Fl. de Paris, p. 190. — *R. Canina globulosa* Desv. l. c. var. 1; au *R. Sepium* 2, du même auteur?

** Tubes ovoides.

IV. *R. ANDEGAVENSIS* Desv.

Voyez titre : de cet ouvrage, p. et fig. 3. — *R. Sempervirens* Rat. l. c. p. 120. (C'est par erreur que nous avons rapporté le Rosier de M. Rat, au *R. Sempervirens*, tom. 2 de cet ouvrage, p. 16.)

1. *R. Andegavensis glaucescens*, *foliis angustiuscissimis* (N.) — *R. Canina intermedia* Desv. observ. p. 157, n° 6. *de Sepium intermedia*, du même auteur. Jour. Bot. l. c. 7.
 2. *R. Andegavensis hispida*, *foliis obovato-lanceolatis glaberrimis* (N.) — *R. Andegavensis* p. D. C. Pl. franc. supplément à la troisième éd. — *R. Sempervirens* Desv. Pl. M. et L. p. 188. — *R. Canina hispida* Desv. obs. 157, p. 5.

Nous terminons ici cette nomenclature à laquelle il nous eût été possible d'ajouter encore; mais nous nous sommes contentés d'y comprendre les seules variétés que nous avons observées dans leur état sauvage. Nous pensons, d'ailleurs, que les caractères, d'après lesquels nous avons cru pouvoir réunir toutes ces espèces en un seul groupe sont suffisants, malgré leur peu d'importance, pour les séparer d'autres individus avec lesquels on les confond souvent. Au reste nous désirons que la sincérité et la bonne foi que nous avons mises dans nos recherches, puissent nous protéger contre le reproche de quelques innovations que nous nous sommes permises, parce que nous les avons crues indispensables.

Les fruits de tous ces Rosiers, que le peuple nomme *des grattes-cats*, sont employés à divers usages dans l'économie domestique. Les Allemands en font une sauce acidulée et très-agréable au goût (*hagebutten-sauce*); elle est d'une couleur semblable à celle qu'on nomme *rouge-honête*. Les anciens croyaient que leurs racines guérissaient la rage.

C'est principalement sur les individus de ce groupe qu'on trouve le *Bédégear*, ou cette espèce de galle chevelue produite par le *Diptolepis* du Rosier. On le rencontre aussi, mais plus rarement, sur les autres espèces sauvages.

Enfin nous dirons, pour ceux qui l'ignorent, que c'est à l'occasion des formes que présentent les cinq divisions du calice des Rosiers *Canina*, ou de *châin*, qu'on a composé ces vers énigmatiques :

*Quique natus frater, natus sororibus et alter,
 Inheretque duo, cum sem-barbis ego.*